




Erdbeeren: Fungizide – 2021.1

Nach der Ernte bzw. nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Erste neue Blätter	Blütenstand- schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Erste weiss Früchte	Beginn der Rotfärbung der Früchte	Wartefrist
Produkte ohne Wartefrist (keine Anwendung zwischen Blühbeginn und Ernteschluss)								
Ridomil Gold: Rhizomfäule, Rote Wurzelfäule <i>max. 1 Beh.</i> (angiesen bei Pflanzung)								
Alial, Alette WG, Alfil WG: Rhizomfäule, Rote Wurzelfäule, <i>max. 4 Beh.</i>								
Stamina S, Booster, Quartet Lux: Rhizomfäule, Rote Wurzelf., Lederf., <i>max. 3 Beh.*</i>								
Kupfer: pilzliche Blattfleckenkrankheit, Teilwirkung: Eckige Blattfleckenkrankheit								
SSH: Systhane C WG, Duotop Plus: Echter Mehltau, Blattfl.krankheiten, <i>max. 4 Beh.</i>								
Schwefel: Echter Mehltau								
Thiram 80: Teilwirkung: Blattflecken- krankheit, Schwarze Fruchtfäule								
Produkte mit Wartefrist (Anwendung mit Wartefrist)								
Aliette WG: Lederf., <i>max. 3 Beh.</i>								4 Wochen
SSH: Slick, Difcor 250 EC, Bogard, SICO: Echter Mehltau, <i>max. 3 Beh.</i> Systhane Viti 240, Topas, Topas vino: Echter Mehltau, <i>max. 4 Beh.</i>								3 Wochen
Stamina S, Booster, Quartet Lux: Teilwirkung: Lederfäule, <i>max. 3 Beh.*</i>								
Legend: Echter Mehltau, <i>max. 4 Beh. (max. 2 Beh. nach Blüte)</i>								
Strobilurine: Flint, Tega: Echter Mehltau, Blattfleckenkrankheiten, Teilwirkung: Grau- fäule, <i>max. 3 Behandlungen</i> Amistar: Echter Mehltau, Teilwirkung: Graufäule, <i>max. 3 Behandlungen</i> Stroby, Stroby WG: Echter Mehltau, <i>max. 3 Behandlungen</i>								
Strobilurine + SDHI: Moon Sensation: Schwarze Fruchtfäule,  Blattfleckenkrankheiten, Echter Mehltau, Lederfäule, Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>								2 Wochen
SDHI: Moon Privilege: Blattfleckenkrankheiten, Echter Mehltau, Graufäule, <i>max. 2 Beh.</i>								
Anilinopyrimidine: Frupica SC, Pyrus 400 SC, Papyrus, Espiro: Graufäule, <i>max. 1 Beh.</i>								
Switch, Play, Avatar: Graufäule, <i>max. 2 Beh.</i> 								
SDHI + SSH: Dagonis, Taifen: Echter Mehltau, <i>max. 3 Behandlungen</i> 								1 Woche
Nimrod: Echter Mehltau								

* **Zu beachten:** Die max. Anzahl von **3 Behandlungen** für die Produkte Stamina S, Booster, Quartet Lux (Wirkstoff: Kaliumphosphanat) gilt für die **Spritz- & Giessanwendung** zusammengezählt.

Zu beachten: Für das Fungizidresistenz-Management wird die Anzahl Behandlungen **pro Wirkstoffgruppe** beschränkt. Diese gilt für Solo-Formulierungen und für Kombinationen mit anderen Wirkstoffen. Die Gruppen sind farbig gekennzeichnet.

- 1) SSH Difeconazol: max. 3 Beh. mit diesem Wirkstoff wegen seiner Wirkung auf Bodenorganismen.
- 2) Für die Anilinopyrimidine (grün) gelten die Einschränkungen nicht für die Gruppe, sondern per Wirkstoff.

Nach der Ernte bzw. nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Erste neue Blätter	Blütenstand- schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Erste weiss Früchte	Begin der Rotfärbung der Früchte	Wartezeit	
Armcarb, Capito Armcarb, BIOHOP FungiCARB, Carbofort: Echter Mehltau; Vitisan, Kalisan: Teilwirkung: Echter Mehltau									3 Tage
			Teldor: Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>						
			Saphire: Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i> ●						
			Prolectus: Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>						
Vacciplant: Echter Mehltau, <u>Teilwirkung:</u> Graufäule (Graufäule: <i>max. 4 Beh.</i>)									0 Tag
			FytoSave, Auralis: <u>Teilwirkung:</u> Echter Mehltau (nur Gewächshaus)						
			Amylo-X: Graufäule						
			Serenade ASO: <u>Teilwirkung:</u> Graufäule (nur Gewächshaus)						
			Prestop: <u>Teilwirkung:</u> Graufäule, <i>max. 2 Behandlungen</i>						

Erdbeeren: Insektizide/Akarizide 2021

Quelle: Agroscope

Nach der Ernte bzw. nach einer Neupflanzung (bis Mitte Sept.)	Winterruhe	Erste neue Blätter	Blütenstand-schieben	Beginn Blüte	Ende Blüte	Erste Jungfrüchte sichtbar	Erste weiss Früchte	Begin der Rotfärbung der Früchte	Wartefrist
Produkte ohne Wartefrist (vor Blüte oder nach Ernte)									
		Genol Plant, Sanoplant Winteröl: Spinnmilben, Blattläuse							
Ende August - Anfangs Sept. Apollo SC: Spinnm. (Eier); max. 1 Beh. Credo, Nissostar: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen); max. 1 Beh.		Apollo SC: Spinnm. (Eier); max. 1 Beh. Credo, Nissostar: Spinnm. (Eier, Larven, Nymphen); max. 1 Beh.							
Envidor: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen); max. 1 Beh. Movento SC: Spinnmilben, Erdbeermilben; max. 1 Beh.		Envidor: Spinnmilben (Eier, Larven, Nymphen); max. 1 Beh. Movento SC: Spinnm., Erdbeermilben, Weisse Fliegen, Blattläuse (Röhrenläuse); max. 1 Beh.							
				Produkte mit Wartefrist (Anwendung mit Wartefrist)					
Zenar, Kiron (HG), Spomil (K): Erdbeermilben, Spinnmilben (alle Stadien); max. 1 Beh.		Zenar, Kiron (HG), Spomil (K): Erdbeermilben, Spinnmilben; max. 1 Beh.							3 Wochen
		Pirimicarb, Pirimor: Blattläuse; max. 2 Beh. ●							
		Pyrethrum FS, Parexan N, Sepal : Blattläuse , Raupen							
		Alanto: Blattläuse, Blütenstecher; max. 2 Beh. ○							1 Woche
		Pyrethroide (versch. Produkte): Thrips, Blütenstecher, max. 2 Beh.							
		Fettsäuren: Spinnmilben, Blattläuse							3 Tage
		Vertimec Gold, Milbeknock: Spinnm., Erdbeerm.; max. 1 Beh.							
		Acramite: Spinnmilben (Eier, Larven), max. 1 Beh.							3 Tage
		Arabella: Spinnmilben (Eier, Larven), max. 1 Beh.							
		Telmion (WS Rapsöl): Spinnmilben, max. 2 Beh.							
		Audienz, Biohop Audienz: Thrips, max. 2 Beh.							
		Audienz, Biohop Audienz, Perfetto: Kirschessigfliege, max. 2 Beh.							

Zu beachten: Für das Insektizidresistenz-Management wird die Anzahl Behandlungen pro **Wirkstoffgruppe** beschränkt. Diese Gruppen sind farbig gekennzeichnet.